



CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 254 du 21/09/94

d'après des observations du 19/09/94

COLZA

Altises

Aucune capture en cuvette jaune depuis 15 jours. Ceci est sans doute dû aux conditions climatiques très défavorables à leur activité.

Quelques morsures sont cependant observées sur de rares plantes.

On peut constater d'autres piqûres et morsures sur cotylédons dus à d'autres insectes type adultes de mineuses à ne pas confondre avec celles d'altises.

Fréquence de pieds atteints

Lieu	Stade	% pieds
51 Prémecy	3F	0
Crugny	2F	0
St Quentin/C.	2F	0
Faux-Vésigneul	3F	4
Sompuis	2F	0
Les Rivières Henrue	3F	4
10 Barberey	2F	0
Marcilly le Hayer	2F	16
Planty	cotyl.	0
Cosdon	3F	8
Prugny	1F	0
Bar/Seine	3F	0

■ Pas de traitement insecticide justifié à l'heure actuelle. Le vol sera tardif et risque donc d'être de faible importance.

Tenthrede de la rave

Les captures d'adultes se poursuivent en bac jaune (20 à 30 captures par semaine). Des pontes ont été observées et les premières larves apparaissent. Celles-ci sont facilement reconnaissables : elles sont gris foncé à noir avec une bande gris verdâtre sur les côtés. Ce sont des fausses chenilles avec 3 paires de pattes thoraciques et 8 paires de pattes abdominales.



Fausse chenille de tenthrede

Compte-tenu de cet été chaud, il se peut que l'on assiste à la 3ème génération de cet insecte.

Les défoliations provoquées par ces larves sont rares et souvent insuffisantes pour justifier un traitement.

■ Ne pas intervenir.

Pucerons

Ravageur complètement absent jusqu'à ce jour. Aucun vol détecté.

Maladies

C'est surtout le mildiou qui est installé sur cotylédons. Les premiers symptômes de phoma sont signalés en tout secteur.

Fréquence de pieds atteints

Lieu	% de pieds
51 Faux Vésigneul	50
Sompuis	50
Bassuet	0
Vanault le Chatel	5
Prémecy	10
10 Virey sous Bar	70
Prunay Belleville	10
Aix en Othe	30

■ Aucun fongicide efficace.

BETTERAVE

Maladies

L'oïdium, toujours bien visible, est moins actif. Il a tendance à régresser. La cercosporiose, au contraire, évolue fortement vers les feuilles centrales.

■ L'intervention fongicide sur les arrachages tardifs est vivement conseillée (voir bulletin précédent).

TOURNESOL

Dessiccation

Nous vous rappelons que la dessiccation des tournesols par voie aérienne, avant récolte, doit faire l'objet d'une déclaration de traitement auprès de notre Service.

■ Seules deux matières actives sont autorisées : le diquat et le diméthipin.

Bref...

■ COLZA : très faible activité des ravageurs. Attention aux limaces.

■ BETTERAVE : progression de la cercosporiose.

■ TOURNESOL : déclaration lors de la dessiccation.

779